



RESUMEN DE CONFERENCIA

Evaluación del Manejo del Programa de Prevención de suicidio Pinar d Rio 2015-2020

Evaluation of the Suicide Prevention Program Management Pinar d Rio 2015-2020

Orely Santiesteban Loaces¹ ✉, Aisa Serrano Gómez¹, Marielis Duarte Gonzalez²

¹Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. Hospital Clínico Quirúrgico Docente “Dr. Leon Cuervo Rubio”. Pinar del Río, Cuba.

²Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Ernesto che Guevara de la Serna”. Pinar del Río, Cuba

Citar como: Santiesteban Loaces O, Aisa Serrano Gómez A, Duarte Gonzalez M, Evaluación del Manejo del Programa de Prevención de suicidio Pinar del Río 2015-2020. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias 2022; 2(3).244 Disponible en: <https://doi.org/10.56294/sctconf2022244>

Recibido: 03-10-2022

Revisado: 17-10-2022

Aceptado: 27-10-2022

Publicado:

RESUMEN

Introducción: el suicidio es un problema de salud por el impacto que ocasiona social, psicológico y económicamente a las familias y al país.

Objetivo: evaluar el manejo del programa de Prevención de Suicidio en Pinar del Río. 2015-2020, en el Nivel Primario de Salud.

Método: estudio descriptivo, observacional y retrospectivo, desde 2015 al 2020, encuestando cincuenta trabajadores de atención médica del policlínico Hermanos Cruz para explorar conocimientos sobre dicho Programa, en un universo de 1840 occisos y una muestra de 400, pertenecientes a dicho policlínico, teniendo en cuenta criterios de inclusión - exclusión.

Resultados: predominio del sexo masculino, entre 30-59 años, de afinidad ancestral predominantemente europeoide. La Hipertensión Arterial, enfermedades psiquiátricas menores y pacientes que se auto-medican ansiolíticos son los principales factores de riesgo y el método suicida más utilizado es el ahorcamiento fundamentalmente en el sexo masculino. Se demuestra desconocimiento del Programa por parte de trabajadores del área de salud y el inadecuado funcionamiento e interrelación del Centro de Salud Mental.

Conclusiones: el sexo masculino predominó en edades entre 30-59 años, de afinidad ancestral Europeoide mediante la utilización del dogal como método elegido. La Hipertensión Arterial, las enfermedades psiquiátricas menores y pacientes que se auto-medican ansiolíticos son los principales factores de riesgo hacia esta conducta. El desconocimiento del Programa por parte de médicos y enfermeras del área de salud y el inadecuado funcionamiento e interrelación del Centro Comunitario de Salud Mental y el Nivel Primario de Salud se hace evidente.

Palabras clave: Dogal; Suicidio; Occiso.

ABSTRACT

Introduction: suicide is a health problem due to the social, psychological and economic impact it has on families and the country.

Objective: to evaluate the management of the Suicide Prevention Program in Pinar del Río. 2015-2020, at the Primary Health Level.

Method: descriptive, observational and retrospective study, from 2015 to 2020, surveying fifty health care workers of the Hermanos Cruz polyclinic to explore knowledge about said Program, in a universe of 1840 deceased and a sample of 400, belonging to said polyclinic, taking into account inclusion - exclusion criteria.

Results: predominance of male sex, between 30-59 years old, of predominantly europoid ancestral affinity. Arterial hypertension, minor psychiatric diseases and patients who self-medicate anxiolytics are the main risk factors and the most used suicide method is hanging, mainly in males. Lack of knowledge of the Program on the part of health care workers and the inadequate functioning and interrelation of the Mental Health Center are demonstrated.

Conclusions: the male sex predominated in ages between 30-59 years, of Europoid ancestral affinity through the use of the noose as the chosen method. Arterial hypertension, minor psychiatric diseases and patients who self-medicate anxiolytics are the main risk factors for this behavior. The lack of knowledge of the Program on the part of physicians and nurses in the health area and the inadequate functioning and interrelation between the Community Mental Health Center and the Primary Health Level is evident.

Keywords: Dogal; Suicide; Suicide; Occiso.